

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 16
du 15 Décembre 1992



TRAITEMENTS D'HIVER

ARBRES FRUITIERS



Renouveler les traitements au cuivre .
Dans les vergers où la chute des feuilles est pratiquement terminée, c'est la troisième application.

Le cuivre protège aussi des attaques de cloque du pêcher, mais n'exclut pas le traitement de pré-débourrement ; qu'on se le dise....

A propos de pêcher, si on a pris soin de repérer les arbres atteints de "plomb" pendant la période de récolte, c'est le moment de les traiter à part pour éviter les contaminations par les outils de taille :

- Protéger les grosses plaies sitôt après la taille, avec des produits à base de goudron dit de norvège.
- Mastic à cicatriser (huile + résine)
- Pâtes fluides cupriques
- Arbochancre, cicatol, baume, mastic antichancre à base de T.B.Z et Fenfuram, baume Pelton DRAWIPAS à base de Triadimefon.

Si les problèmes de parasites, notamment les cochenilles qui encroûtent les troncs et les branches maitresses, se sont montrés virulents pendant la période végétative, utiliser les huiles à la lance :


- 1) Huiles jaunes
- 2) Colorants nitrés ou DNOC
- 3) Huiles minérales de pétrole

VIGNE

La taille est engagée depuis quelque temps.

Cette opération consiste à supprimer les sarments du cep pour lui donner une certaine forme de manière à favoriser sa croissance et sa fructification.

Il faut profiter de cette opération pour déceler les maladies du bois et notamment :



* Esca

En coupe transversale du cep, on constate une zone centrale jaune et molle, friable, parfois bordée d'un liseré marron.

coupe d'un cep atteint par l'esca

* Excoriose

La base du sarment se crevasse, elle blanchit en automne parsemée de petits points noirs (pycnides). Chacun de ces réservoirs expulsent un filament contenant des millions de spores susceptibles de disperser par l'action mécanique des pluies.

On observe un étranglement caractéristique à l'insertion du rameau ; le moindre vent le fait chuter.

Plus tard, la rafle peut se dessécher à l'extrémité. Il arrive que la grappe entière soit touchée.



Etrangement et nécrose à la base du sarment

* Eutypiose

"Maladie du bras mort"

La coupe transversale d'un bras laisse nettement apparaître une nécrose brune, sectorielle de consistance très dure.



* Pourridié

Ce champignon affecte de nombreux végétaux dont la vigne.

Il s'introduit par une blessure au niveau du collet mais aussi par contact racinaire. C'est l'explication de son type d'extension en "rond" ou sur un "rang" dans un vignoble favorisé par un sol humide, compact, mal drainé.

(C) - S.R.P.V. - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.